



**Nombre del Paciente:** Judith Mickelson

**Nombre del Profesional Médico:** Dr. Jeff Levin, MD

### **AMLODIPINE/ATORVASTATIN (Por la boca)**

**Sirve para tratar la presión arterial alta y la angina de pecho. También sirve para bajar el nivel de colesterol en su sangre. Este medicamento es una combinación de un bloqueador del canal del calcio y un inhibidor de la reductasa HMG-CoA conocido a veces como estatina.**

#### **Marca(s):** Caduet

Existen muchas otras marcas de este medicamento.

#### **Este medicamento no debe ser usado cuando:**

Usted no debe usar este medicamento si alguna vez ha tenido una reacción alérgica a la almopidina o atorvastatina. Tampoco debe usar este medicamento si en la actualidad tiene enfermedad en el hígado o si está dando de lactar (amamantando) o embarazada.

#### **Forma de usar este medicamento:**

- Su médico le dirá la cantidad de medicamento que usted debe usar y la frecuencia para usarlo. Puede ser necesario cambiar su dosis varias veces hasta encontrar la dosis más conveniente para usted. No use más cantidad de medicamento ni lo use con más frecuencia de lo ordenado por su médico.
- Siga cuidadosamente las instrucciones del médico relacionadas con alguna dieta especial. Este medicamento es sólo parte de un plan para bajar el colesterol y los triglicéridos en su sangre.

#### **Si una dosis es olvidada:**

- Si olvida una dosis de su medicamento, úselo lo más pronto posible. Si es casi hora de su próxima dosis, omita la dosis olvidada y espere hasta entonces para usar el medicamento. No use medicamento adicional para reponer la dosis olvidada.

#### **Forma de guardar y botar este medicamento:**

- Guarde el medicamento en un recipiente cerrado a temperatura ambiente, alejado del calor, la humedad y la luz directa.
- Bote los medicamentos cuya fecha de vencimiento haya expirado y medicamentos que ya no necesita, siguiendo las instrucciones del farmacéutico, médico o paramédico.
- Guarde todos los medicamentos fuera del alcance de los niños y nunca comparta sus medicamentos con otras personas.

#### **Medicamentos y alimentos que debe evitar:**

**Consulte con su médico o farmacéutico antes de usar cualquier medicamento, incluyendo los que compra sin receta médica, las vitaminas y los productos herbales.**

- No olvide informarle al médico si usted está usando, digoxina (Lanoxin®), eritromicina, cimetidina (Tagamet®), spironolactona (Aldactone®), ciclosporina (Neoral®, Sandimmune®) o medicamentos para tratar infecciones micóticas (por hongos) como fluconazol, itraconazol, ketoconazol, Diflucan®, Nizoral®, Sporanox®. No olvide informarle al médico sobre el resto de medicamentos que esté usando para bajar el colesterol o los triglicéridos, como gemfibrozil (Lopid®), fenofibrato (Tricor®) o niacina incluyendo los suplementos vitamínicos, Niaspan®, Advicor®.
- No olvide informarle al médico si usted acostumbra a tomar alcohol.
- No use antiácidos, como Maalox®, Mylanta® o Tums® sin antes consultar con el médico.

**Precauciones durante el uso de este medicamento:**

- El uso de este medicamento durante el embarazo puede perjudicar a su bebé antes de nacer. Use un anticonceptivo efectivo para evitar el embarazo. Si usted cree que ha quedado embarazada mientras usaba este medicamento, dígame inmediatamente al médico.
- No olvide informarle a su médico si usted padece de cualquier enfermedad al corazón, incluyendo insuficiencia cardíaca congestiva, problemas con las válvulas cardíacas o con sus vasos sanguíneos. No olvide informarle al médico si usted tiene historia clínica en su familia de enfermedad en el hígado.
- El médico le ordenará exámenes de sangre durante las visitas regulares mientras usted esté usando este medicamento. Cumpla sin falta con todas sus citas médicas.
- No olvide informarle al médico o dentista encargado de atenderle que usted está usando este medicamento. Es posible que tenga que suspender el uso de este medicamento si le van a practicar cirugía mayor o si tiene una lesión grave. Es posible que también tenga que suspender su medicamento si presenta otros problemas graves de salud, como convulsiones o problemas en su sangre.

**Efectos secundarios que pueden presentarse durante el uso de este medicamento:****Consulte inmediatamente con el médico si nota cualquiera de estos efectos secundarios:**

- Reacción alérgica: picazón o ronchas, hinchazón en la cara o en las manos, hinchazón o cosquilleo en la boca o garganta, opresión en el pecho, dificultad para respirar.
- Ampollas, descamación o salpullido rojo en la piel.
- Dolor en el pecho (puede ser relacionado con su enfermedad y no un efecto secundario).
- Disminución en la cantidad de orina y la frecuencia con que orina.
- Desmayos o sofocos.
- Dolor, debilidad o espasmos musculares, especialmente con fiebre o debilidad.
- Color amarillo en los ojos o la piel.

**Consulte con el médico si nota los siguientes efectos secundarios menos graves:**

- Dolor de cabeza
- Dolor muscular, leve o breve.
- Náuseas, problemas estomacales, gas, estreñimiento, diarrea.
- Congestión o secreción nasal.
- Hinchazón de manos, tobillos o pies.

**Consulte con el médico si nota otros efectos secundarios que cree son causados por este medicamento.**

 © 1974-2004 Thomson MICROMEDEX. All rights reserved. The CareNotes(TM) System Vol.122

**AMLODIPINE/ATORVASTATIN (Oral) - DrugNote, Spanish**  
**Monday, October 18, 2004 4:31:19 PM GMT**

---

Hours of Operation: 8:00am - 6:00pm M-Th, 8:00am - 3:00pm Friday.  
**Please call (408) 267-4000 during business hours.**  
**Please call (408) 267-3489 after-hours in case of an emergency.**

**The Grover Medical Group:** Dr. Judith Burmeister, Dr. Mark Kleid, Dr. Jeff Levin, Dr. Calvin Madison