



Nombre del Paciente: Lindy Gee Yung
Nombre del Profesional Médico: Dr. Mark Kleid, MD

FLUOXETINE (Por la boca)

Sirve para tratar la depresión, el trastorno obsesivo compulsivo, trastornos de alimentación y trastorno disfórico premenstrual (trastornos del humor y síntomas físicos que ocurren 1 a 2 semanas antes de la menstruación en las mujeres). Este medicamento es un inhibidor selectivo de la recaptación de la serotonina.

Marca(s): Prozac, Prozac Weekly, Sarafem, Fluoxetine HCl, Rapiflux

Existen muchas otras marcas de este medicamento.

Este medicamento no debe ser usado cuando:

No use este medicamento si alguna vez ha tenido una reacción alérgica a la fluoxetina o ha tomado algún inhibidor de la MAO (Eldepryl®, Marplan®, Nardil®, Parnate®) o tioridazina (Mellaril®) en las últimas 2 a 5 semanas. No use inhibidores de la MAO o tioridazina por al menos 5 semanas después de haber suspendido este medicamento.

Forma de usar este medicamento:

Cápsula, Tableta, Líquido, Cápsula de liberación programada

- Su médico le dirá la cantidad de medicamento que usted debe tomar y la frecuencia para hacerlo. No tome más cantidad de medicamento ni lo tome con más frecuencia de lo ordenado por su médico. Algunas personas necesitan tomar este medicamento todos los días, y otras personas sólo necesitan tomarlo una vez a la semana. Tenga la seguridad de entender su horario personal.
- Usted puede tomar este medicamento o sin con comida. Tome su medicamento a la misma hora todos los días.
- No abra, rompa o mastique la **cápsula de liberación prolongada**. Tráguela (pásela) entera.

Si una dosis es olvidada:

- Para las personas que toman este medicamento **todos los días (Prozac® o Sarafem®)**: Si olvida tomar una dosis de su medicamento, tómelo lo más pronto posible. Si es casi hora de su próxima dosis, omita la dosis olvidada y espere hasta entonces para tomar el medicamento. No use medicamento adicional para reponer la dosis olvidada.
- Para las personas que toman este medicamento **una vez a la semana (Prozac® semanal)**: Si olvida tomar una dosis de su medicamento, tómelo lo más pronto posible. Luego regrese a su horario regular la siguiente semana. No use medicamento adicional para reponer la dosis olvidada.

Forma de guardar y botar este medicamento:

- Guarde el medicamento a temperatura ambiente en un envase cerrado, alejado del calor, la humedad o la luz directa.
- Bote los medicamentos cuya fecha de vencimiento haya expirado y los medicamentos que ya no necesita siguiendo las instrucciones del farmacéutico, médico o paramédico.
- Guarde todos los medicamentos fuera del alcance de los niños y nunca comparta sus medicamentos con otras personas.

Medicamentos y alimentos que debe evitar:

Consulte con su médico o farmacéutico antes de usar cualquier medicamento, incluyendo los que compra sin receta médica, las vitaminas y los productos herbales.

- No olvide informar a su médico acerca de **TODOS** los medicamentos que usted está usando, especialmente anticoagulantes (Coumadin®), digoxina (Lanoxin®), triptofán, litio, medicamentos para las convulsiones (como Dilantin®, Tegretol®), benzodiacepinas (como Valium®), sumatriptán (Imitrex®), medicamentos para tratar la depresión (como amitriptilina, trazodona, Effexor®, Luvox®, Paxil®, Zoloft®), medicamentos para la esquizofrenia (como Haldol®, Risperdal®), medicamentos para los problemas del ritmo cardíaco (como verapamilo, Cardioquin®, Rythmol®, Sectral®, Tambocor®) o diuréticos (como furesomida, Norvasc®).
- No olvide informar a su médico si usted está usando algún medicamento que le produce sueño (como las píldoras para dormir, medicamentos para los resfriados o las alergias, medicamentos narcóticos para el dolor o sedantes). No beba alcohol mientras esté usando este medicamento.

Precauciones durante el uso de este medicamento:

- No olvide informarle a su médico si está embarazada o dando de lactar, o si tiene convulsiones, presión arterial alta, diabetes o enfermedad al corazón, hígado o riñón.
- Si llega a presentar salpullido en la piel, aunque sea leve, suspenda el uso de este medicamento y llame a su médico inmediatamente.
- Este medicamento puede producirle mareo o sueño. Levántese lentamente cuando se encuentre en posición acostada o sentada. No maneje automóvil o trabaje con maquinaria pesada ni haga alguna otra cosa que pueda ser peligrosa si usted no está alerta.

Efectos secundarios que pueden presentarse durante el uso de este medicamento:

Consulte inmediatamente con el médico si nota cualquiera de estos efectos secundarios:

- Reacción alérgica: picazón o ronchas, hinchazón en la cara o en las manos, hinchazón o cosquilleo en la boca o garganta, opresión en el pecho, dificultad para respirar
- Confusión, debilidad severa, movimientos o contorsiones musculares incontrolables
- Sensación de agitación o ansiedad intensas
- Hablar, sentirse y actuar con agitación que usted no puede controlar

Consulte con el médico si nota los siguientes efectos secundarios menos graves:

- Cambios en el apetito con aumento o pérdida de peso
- Disminución del interés por el sexo o pérdida de la capacidad sexual (impotencia)
- Boca seca, garganta irritada o ronquera
- Dolor de cabeza
- Náuseas o diarrea
- Nerviosismo, temblores, sudores
- Estremecimiento
- Dificultad para dormir
- Debilidad o cansancio inusual, dificultad para concentrarse

Consulte con el médico si nota otros efectos secundarios que cree son causados por este medicamento.

© 1974-2004 Thomson MICROMEDEX. All rights reserved. The CareNotes(TM) System Vol.122

**FLUOXETINE (Oral) (Capsule, Tablet, Liquid, Capsule, Delayed Release) - DrugNote,
Spanish**

Monday, October 18, 2004 4:44:53 PM GMT

Hours of Operation: 8:00am - 6:00pm M-Th, 8:00am - 3:00pm Friday.
Please call (408) 267-4000 during business hours.
Please call (408) 267-3489 after-hours in case of an emergency.

The Grover Medical Group: Dr. Judith Burmeister, Dr. Mark Kleid, Dr. Jeff Levin, Dr. Calvin Madison